

VADAK URA MAGAZIN

MADARAK



7. szám

Hírek

A Tigris érméket csak szeptembertől júniusig gyűjtheted vresenyfüzetekkel! Az elkezdett versenyfüzeteket ősszel tudod csak újra folytatni.

A következő bajnokság a Gekko Útja lesz szeptemberben, ahol a sivatagi állatok lesznek előnyben a Tigris érmék gyűjtéséhez.

Kalandra fel!

Június 24-25-én lezajlott az első Vadak Ura tábor. 30 diák vett részt a kétnapos retro kártya gyűjtésében, ahol a Retro Kártyák útján jóval kevesebb Tr-ért jutottak hozzá a régi lapokhoz. A táborban nem csak a kártyák csatáztak, de volt kártyavadászat tapadókorongos íjakkal és többen végigjárták a Vadak Ura Expedíciót is.



BARÁTPOSZÁTA

SYLVIA ATRICAPILLA — DALLAMOS, REJTŐZKÖDŐ ÉNEKESMADÁR

IUCN: LC
legkevésbé aggasztó



ÉLŐHELY

Főként lombos erdőkben, cserjés aljnövényzetű erdőszéleken, ligetekben, parkokban, nagyobb kertekben és bozotos sövényekben költ. Szereti a sűrű bokros takarást és a magasabb énekhelyeket. Télen cserjésekben, kertekben és gyümölcsös környezetben is gyakori lehet.

ELTERJEDÉS



1 Fekete fejsapka – a him legfeltűnőbb bélyege

3 Szürkés tollazat – visszafogott, mégis elegáns megjelenés

4 Erős, finom lábak – bokrok és ágak között ügyes mozgás

2 Karcú, hegyes csőr – rovarok és bogók fogyasztásához

5 Dallamos ének – gyakran a "hamis család" néven emlegetik

6 Vonuló viselkedés – sok állománya ősszel délre húzódik



TÁPLÁLKOZÁS

Költéskor főként rovarokat fogyaszt, nyár végétől és ősszel egyre több bogyót és gyümölcsöt eszik. A fiókákat főleg puha testű rovarokkal eteti.



MÉRETEK

	Testhossz: kb. 13 cm
	Szárnyfesztáv: kb. 20–23 cm
	Tömeg: kb. 16–25 g
	Tojások száma: 4–6
	Kirepülés: kb. 11–12 nap a kelés után

★ MI TESZI KÜLÖNLEGESSÉ?

- A hím fekete, a tojó vörösbarna fejsapkát visel
- Gazdag, fuvalózó éneke nagyon jellegzetes
- Részben vonuló faj, egyes állományai áttelelnék enyhébb vidékeken
- A táplálék szezonálisan változik: rovarról bogyóra vált
- Jól alkalmazkodik emberközeli élőhelyekhez is

SZAPORODÁS

A csésze alakú fészket bokorban vagy alacsony fán, többnyire sűrű takarásban építi. Mindkét szülő részt vesz a kotlásban és a fiókák etetésében. Általában 1 fészkelji jellemző, de kedvező körülmények között lehet második is.



HÍM ÉS TOJÓ



A hím fejsapkája fekete, míg a tojóé gesztenyebarna. A többi tollazat mindkét ivarnál hasonló, szürkés.

GYORS TÉNYEK



Énekesmadár



Részben vonuló



Erdő és kert lakója



Tavasszal rovaréó



Ősszel bogyéóó



FŐ VESZÉLYEK



Élőhelyek feldarabolódása



Fészek-predáció



Üvegfelületeknek ütközés



Szélsőséges időjárás a vonulás idején

Kártya sorszáma:

1017

Érték:

3 Tr

SÁRGAFEJŰ KIRÁLYKA

REGULUS REGULUS — APRÓ, LENDÜLETES ROVAREVŐ ÉNEKESMADÁR

IUCN: LC
legkevésbé aggasztó



ÉLŐHELY

Elsősorban tűlevelű és vegyes erdőkben él, különösen luc- és fenyőállományokban. Költ hegyvidéki erdőkben, ültetett fenyvesekben, parkokban és nagy kertekben is, ha vannak sűrű tűlevelű fák. A fészket rendszerint jól rejtve, vékony ágakra függeszti.

ELTERJEDÉS



- Fészkelő terület
- Vonulási útvonalak
- Téli előfordulás

2

Parányi testméret – Európa egyik legkisebb madara

1

Aransyárga fejtető – a himnnél narancsos középsikkal

3

Vékony csőr – apró rovarok és pókok csipegetésére

4

Fürge mozgás – ágak közt lebeveg is táplálkozik

5

Két halvány szárnycsík – finom, mégis jellegzetes mintázat

6

Vékony, magas hang – éles, cérnavékony ének



TÁPLÁLKOZÁS

Szinte egész évben apró ízeltlábúakat keres a lombkoronában. Téli gyakran pókokra támaszkodik, és a tűlevelek közül csipegeti ki a rejtett zsákmányt.



MÉRETEK

- Testhossz: 8,5–9,5 cm
- Szárnyfesztáv: 13,5–15,5 cm
- Tömeg: 4,5–7 g
- Tojások száma: 6–13 (gyakran 9–11)
- Kikelés / kirepülés: 17–22 nap
- Kotlás: kb. 15–17 nap

★ MI TESZI KÜLÖNLEGESSÉ?



Apró, de rendkívül aktív és magas anyagcseréjű



Gyakran lebeveg kutat a tűlevelek között



Főként tűlevelű erdők specialistája



A hím díszre a narancsos-sárga koronacsík



Hideg teleken állománya erősen csökkenhet

SZAPORODÁS

Mély, gömbölyded, mohából, zuzmóból és pókhálóból épített fészket készít, rendszerint luc- vagy fenyőágon. Egy szezonban gyakran két fészkeljárt is nevel. A tojó többnyire 9–11 tojást rak, a kotlás kb. 15–17 nap, a fiókák 17–22 nap után repülnek ki.



Fészkek



9–11 tojás



Kotlás



15–17 nap



Fiókák

17–22 nap

Kirepülés

HÍM ÉS TOJÓ

HÍM

TOJÓ



A hím fejteőcsíkja sárga-narancsos, a tojóé tisztábban sárga. A test tollazata mindkét nemnél hasonló: olajzöld hát, világos has, két világos szárnycsík.

GYORS TÉNYEK



Apró énekesmadár



Tűlevelű erdők lakója



Rovarevő



Gyakran 2 fészkelaj



Európa egyik legkisebb madara

Kártya sorszáma:

1018

Érték:

3 Tr

Kanári

Serinus canaria

Élőhely

Őshonos a Makarónézia térségében: a Kanári-szigeteken, Madeirán és az Azori-szigeteken. Félnyílt területeken, bozótosokban, kertekben, erdőséleken és mezőgazdasági területeken él.



Táplálkozás

Főként apró magvakat fogyaszt. Emellett rügyeket, zsemeke növényi részeket, gyümölcsöt, és költési időszakban kisebb rovarokat is eszik.



magvak



gyümölcsök



rügyek, zsemeke növényi részek



rovarok (költési időszakban)

Méret



cm
12
10
8
6
4
2
0

Testhossz: 10–12 cm

Szárnyfesztávolság: 20–23 cm

Tömeg: kb. 8–24 g
(átlagosan ~15 g)

Jellegzetes tulajdonságok



Dallamos, csengő ének



Vad őse a házi kanárinak



Természetes tollazata többnyire sárgászöld, finom csíkozással



Élénk, mozgékony, gyakran csapatokban látható

Szaporodás

A fészket bokrokba vagy fára építi. Egy fészkealjban általában 3–5 tojás van. A költési idő kb. 13–14 nap, és egy szezonban gyakran 2–4 költés is lehet.



fészkeképítés



tojások



fiókanevelés

Kártya sorszáma:

687



Safari Park
társasjáték

Erdélyi kopasznyakú tyúk

Gallus gallus

Élőhely

Ósi házi tyúkfajta, amely Erdélyből származik. Ma főként háztáji udvarokban, tanyákon és kisebb gazdaságokban tartják a Kárpát-medencében. Jól alkalmazkodik a szabadtartáshoz, szereti a száraz kikutót, a napos udvart és a vidéki porták változatos környezetét.



Méret



♂ Kakas: 2,5–3,0 kg



♀ Tojó: 2,0–2,3 kg



Tojás tömege:
kb. 40–55 g



Testalkat: közepes, erős

Jellegzetes tulajdonságok



Feltűnően csupasz, piros nyak



A tollhiányt a domináns Na gén okozza



Edzett, ellenálló, jó hőtűrésű



Kettős hasznosítású:
húsrá és tojásra is tartják



Színváltozatai lehetnek
fehér, fekete és kendermagos



fehér



fekete



kendermagos

Táplálkozás

Mindenevő baromfi. Fő tápláléka a gabona és a magkeverék, de szívesen fogyaszt zöld növényi részeket, konyhai maradványokat, valamint rovarokat és férgek is, ha kápirgálhat.



gabonafélék



zöldtakarmány



rovarok, férgek



magvak, háztáji eleség

Szaporodás



A tojók évente általában kb. 140–180 tojást adnak. A tojások többnyire fehérék vagy világos krémszínűek. A kotlási idő körülbelül 21 nap, egy fészkaljban gyakran 10–15 tojás van.



tojásrakás



kotlás



csibék



Érték:

5 Tr



Kártya
sorszám:

386

FENYŐSZAJKÓ

Nucifraga caryocatactes



Élőhely

Főként tajgai és hegyvidéki tűlevelű erdők lakója. Elterjedése Európától Szibérián át Kelet-Ázsiáig tart. Kedveli a luc-, jegenyefenyő- és cirbolyafenyő-állományokat, mert ezek magjai adják fő táplálékát.



Elterjedési terület
(északi és hegyvidéki
fenyes övezet)



Méretek



Testhossz: 32–38 cm

Szárnýfesztávolság: 49–53 cm

Tömeg: 124–220 g

Csőr: erős, hosszú, hegyes



Jellegetes tulajdonságok



Sötétbarna tollazat fehér pettyekkel



Erős csőr a magok feltöréséhez



Kiváló memóriával több ezer magot rejt el



Fontos magterjesztője a fenyőknek



Rekedt, érdes hangja messziről hallható



Táplálkozás

Legfontosabb tápláléka a fenyőmag, különösen a nagy magvú fenyők termése. Emellett lucmagot, mogyorót, bogyókat, rovarokat, pókokat, sőt időnként tojásokat vagy kisebb gerinceket is fogyaszt. A magokat a begyében szállítja, majd elrejtje télire.



1. fenyőmagok



2. mogyoró, bogyók



3. rovarok, pókok



4. tojások,
apró zsákmány



Szaporodás

Fészket többnyire tűlevelű fákra építi. A fészkalj rendszerint 2–4 tojásból áll. A kotlás kb. 18–19 napig tart, a fiókák pedig 24–26 nap múlva repülnek ki. A költés korán, gyakran még a hófoltok idején kezdődik.



fészkeképítés



tojások



fiókanevelés

Kártya sorszáma:

240

Érték:

8 Tr

Holló

Corvus corax



1. ÉLŐHELY



A Föld északi féltekéjének nagy részén él.

Megalátható hegyvidékeken, sziklás partokon, erdőkben, tajgán, tundrán, pusztákon és mezőgazdasági területek közelében is. Fészkelhet sziklapárkányon, magas fákon és emberi építményeken is.



3. MÉRETEK



Testhossz:
54–67 cm



Szárnyszélesség:
115–130 cm



Tömeg:
0,7–1,6 kg



Farok:
ék alakú



Csőr:
nagy, erős,
enyhén ívelt



5. JELLEGZETES TULAJDONSÁGOK



Az egyik legnagyobb énekesmadár.



Teljesen fekete, fémesen csillogó tollazattal.



Bozontos toroktollai és ék alakú farka jól felismerhetővé teszik.



Rendkívül intelligens, kiváló problémamegoldó.



Hangja mély, rekedt "korrp".



Gyakran párban vagy kisebb családi csoportban látható.



2. TÁPLÁLKOZÁS

Mindenévő és rendkívül opportunista. Fogyaszt döghúst, rovarokat, kismélsőket, madarakat, tojásokat, gyümölcsöket, magvakat és emberi eredetű táplálékmaradékokat is.



DÖGHÚS



ROVAROK



KISEMÉLSŐK



TOJÁSOK



BOGYÓK
ÉS MAGVAK

4. SZAPORODÁS



A párok gyakran tartószák, sokszor éveken át együtt maradnak. Nagy gallyfészket épít sziklára, fára vagy építményre. Egy fészkeljében rendszerint 3–7 tojás van. A kotlási idő 20–25 nap, a fiókák 28–50 nap után repülnek ki.



FÉSZKEPÉPÍTÉS



TOJÁSOK



FIÓKANEVELÉS



6. TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ



IUCN státusz:
LC – nem fenyegetett.



Rendkívül nagy elterjedésű és világszerte gyakori faj.



Állománya sok térségben stabil, de helyenként érzékeny lehet a zavarásra, mérgezőesekre és élőhelyi változásokra.



www.fehersolyom.hu



KÁRTYA SORSZÁMA:

253



ÉRTÉK:

15 Tr



Lumma

Uria aalge

1. Élőhely



Hideg és mérsékelt övi tengerek madara. Az Északi-Atlanti-óceán és az Északi-Csendes-óceán partvidékein él. Költési időben sziklás tengerpartokon, meredek sziklafalakon és tengeri madártelepeken fészkel, az év nagy részét pedig a nyílt tengeren tölti.



2. Táplálkozás



Főként apró halakat zsákmányol a víz alatt üldözve. Emellett fogyaszt rákféléket, puhatestűeket és egyéb tengeri gerinctelenekeket is. Kiváló búvár, szárnyaival 'repül' a víz alatt.



halak



rákfélék



puhatestűek



tengeri gerinctelének

3. Méretek



61–73 cm

- Testhossz: 38–46 cm
- Szárnyfesztávolság: 61–73 cm
- Tömeg: kb. 0,85–1,1 kg
- Testalkat: áramvonalas, rövid szárnyú búvármadár

4. Szaporodás



A lumma sűrű kolóniákban költ. Fészket szinte nem épít: egyetlen körte alakú tojását közvetlenül a csupasz sziklapárkányra rakja. A kotlási idő általában 28–34 nap. A fiókák kb. 18–25 napon belül röpképtelenül leugrik a sziklafalról a tengerbe, ahol többnyire az apjával marad tovább.



tojás a sziklapárkányon



kotlás



fióka ugrása a tengerbe

5. Jellemző tulajdonságok



Pingvinszerű testtartás a szárazföldön



Nagyon sűrű költőtelepeket alkot



Kiváló búvár, akár nagy mélységbe is lemerül



Keskeny, hegyes csőr



A fiókák híres "sziklaugrók"



A tengeren szinte egész életét vizen tölti

6. Természetvédelmi státusz



LC
Nem
fenyegetett



IUCN státusz: LC – nem fenyegetett. Elterjedt és sok helyen gyakori tengeri madár, de egyes állományaira veszélyt jelenthetnek az olajszenyezések, a halászhálóba gabalyodás, a táplálékbázis változásai és a költőhelyek zavarása.



Kártya sorszáma: 439



Érték: 20 Tr

Smaragd törpetukán

Aulacorhynchus prasinus




1. ÉLŐHELY

A faj Közép-Amerika hegyvidéki és dombvidéki erdeiben él, főként Dél-Mexikótól Guatemalán, Hondurason, Nicaraguán és Costa Ricán át Panamáig. Kedveli a nedves hegyvidéki erdőket, köderdőket, erdőszegélyeket, másodlagos erdőket és részben ültetvényeket is. Tengerszint felett általában kb. 600–3000 m között fordul elő.



3. MÉRETEK



- Testhossz: kb. 29–37 cm
- Tömeg: kb. 150–230 g
- Csőr: nagy, ívelt, feltűnő
- Farok: viszonylag hosszú

5. JELLEGZETES TULAJDONSÁGOK

- Élénk smaragdzöld tollazat
- Színes, nagy csőr
- Zigodaktíl láb (két ujj előre, kettő hátra)
- Párokban vagy kisebb csapatokban mozog
- Erős, rekedt ugató hang
- Fontos gyümölcssevő magterjesztő



2. TÁPLÁLKOZÁS

Főként gyümölcsöket fogyaszt, de rovarokat, hernyókat, pókokat, kisebb gyíkokat, madártojásokat és fiókákat is elfogyaszthat. **Fontos magterjesztő.**



4. SZAPORODÁS

Faodvakban vagy harkályok által elhagyott odúkban költ. A költési időszak többnyire márciustól júliusig tart. A fészkalaj rendszerint 3–4 tojásból áll, de 1–5 is lehet. A kotlási idő kb. 16 nap, a fiókák kb. 42–45 nap múlva repülnek ki.



LC

Nem fenyegetett

6. TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ

IUCN státusz: LC – nem fenyegetett. Elterjedése nagy, de állománya helyenként csökkenhet az élőhelyek átalakulása és az erdőirtás miatt.



FEHÉRFEJŰ RÉTISAS

Haliaeetus leucocephalus

1. Élőhely

Észak-Amerikában honos ragadozómadár. Főként tavak, nagy folyók, víztározók, tengeröblök és tengerpartok közelében él, ahol bőséges a táplálék és magas fák vagy sziklák állnak rendelkezésre. Fészkelhet erdős partvidéken, mocsarak közelében és egyes helyeken emberi környezethez közel is.



Elterjedési terület

2. Táplálkozás

Táplálékának alapját a halak adják, de vízimadarakat, kisebb emlősöket, hüllőket és dögöt is fogyaszt. Gyakran zsákmányol a víz felszínéről, és más madaraktól is elragadhat prédát.



halak



vízimadarak



kisemlősök



dög/carrion

5. Jellemző tulajdonságok

- Fehér fej és farok, sötétbarna test
- Nagy, sárga kampós csőr
- Erőteljes karmaival ragadja meg a zsákmányt
- Kiváló látás, erőteljes repülés és siklás
- Gyakran magányosan vagy párban látható
- Az USA nemzeti jelképe
- A világ egyik legismertebb ragadozómadara

3. Méretek

180-230 cm



70-102 cm



Testhossz: 70-102 cm



Szárnyfesztávolság: 180-230 cm



Tömeg: kb. 3,0-6,3 kg



A tojó általában nagyobb a hímnél

4. Szaporodás

A párok többnyire tartósak, gyakran évekig vagy akár élethosszig együtt maradnak. Hatalmas gallyfészket építenek magas fára vagy sziklára, és ugyanazt a fészket évről évre bővíthetik. A fészkelési rendszerint 1-3 tojásból áll. A kotlási idő 34-36 nap, a fiókák 56-98 nap után repülnek ki.



fészkek



tojások



fiókák

6. Természetvédelmi státusz

LC
Nem
fenyegetett

IUCN státusz: LC – nem fenyegetett. A faj állománya ma stabil és sok helyen növekvő. A 20. században a DDT, az üldözés és az élőhelyromlás miatt erősen megfogyatkozott, de mára látványos természetvédelmi sikertörténet vált. A helyi veszélyek között ma is szerepelhet az ölomérgezés, a zavarás és az élőhelyek átalakulása.



DDT
műteli
fenyegetések



állomány
növekvő



természetvédelmi
siker



Kártya sorszáma: 1009

Érték: 125 Tr

TIPPEK és trükkök

Kérdés: Van olyan építmény, ami ilyen hatást ad: Az állatok védekezése 1-gyel nő. Az épületek csak arra a játékosra hatnak, aki felépítette, vagy pedig mindenkire?

Válasz: Az épületek a legtöbbször csak arra hatnak, aki felépítette őket. Ha előnyös a hatás, akkor az építő játékosra hat, ha hátrányos, akkor a többi játékost érinti. A szakadékot például minden játékosra vonatkozik, így a védő és a támadó is csak repülni tudó állattal támadhat. Ezért, ha nincsenek repülő állataid, ne építs szakadékot!

Tudtad? Alapvetően három állat lehet egyszerre a területhátáron. Ez nem vonatkozik a csapatban levő állatokra. Ezekből bármennyi lehet, ha ugyanabba a fajba tartozik. Három gímszarvas is csak egy helyet foglal el a határon, ezért mellé még kitehető két másik állat, vagy állatcsapat.

Ha a csapatban élő állat a központban van, az ugyanolyan fajba tartozó lapok csak feleannyiba kerülnek.

Kérdés: Én elhasználok minden Ap-mat, és passzolok. Ellenfelem kitesz egy parazita állatot, és akar tőlem lopni egy Ap-t. Ilyenkor tud lopni, amikor nincs Ap-m, vagy nem?

Válasz: Csak létező Ap-t lehet lopni. O Ap-s játékostól a paraziták nem lohatnak semmit.

Kérdés: Van néhány kiegészítő, ami többféle állatcsoportra is tehető. Ettől függetlenül a kiegészítő csak egy állatra hat?

Válasz: A kiegészítőket csak egy konkrét állatra lehet tenni. Utána már át sem rakhatók, tehát csak arra az egy állatra hatnak. A kiegészítők az állat pusztulásakor vele együtt a gyűjtőbe kerülnek.

Kérdés: Egy állaton bármennyi kiegészítő lehet, de ugyanaz a kiegészítő nem (pl.: bőrre bőr)?

Válasz: Igen, minden kiegészítőt csak egyszer lehet egy állatra tenni, de más kiegészítő még rátehető.

MESTER KÁRTYÁK

Kérdés: Hány Mester kártyát használhatok egyszerre?

Válasz: Egyféle Mester kártyából csak egyet használhatsz egyszerre, tehát például nem tehetsz ki két szarka fészket, hogy kettővel növeld a Madarak erejét!



Kérdés: A Mester kártya csak egy állatra hat?

Válasz: A Mester kártya minden olyan állatra hat, ami a kártyán fel van tüntetve. A szarka fészke például csak a madarakra hat, de minden aktív madárra. Ez az egyik legfőbb különbség a Társulás kártyákhoz képest, amelyek csak egy-egy állatra tehetők.

Kérdés: Ha Tigris szintű Mester kártyát használok, akkor használhatok-e Bajnok kártyát?

Válasz: Használhatsz Bajnok kártyát, de akkor nem kezdhetsz, csak 10 területtel. Ez Gizzly kártyákra is ugyanígy érvényes. Ha csak Tigris szintű kártyát használsz, de nem használsz magasabb szintű lapot, akkor a Mester kártyán fel tüntetett 12 területtel kezdheted a játékot. Ezek a szabályok akkor is érvényesek, ha játék közben nem sikerül kihúznod ezeket a lapokat, csak a paklidban vannak.

Kérdés: Lehet-e Mester kártyával öngyilkosságot elkövetni úgy, hogy a kártya kirakásával elfogy a területem?

Válasz: Ez szabálytalan játékot jelent abban az esetben, ha Tr-ért játszol. Ha tehát úgy veszítesz, hogy lenullázod a saját területedet, akkor a játék után nem jár Tr!

Más esetben a játékot szabadon feladhatod úgy is, hogy nem vásárolsz Mester kártyát.

Bajnokságon az ilyen lépés vereségnek számít.

ŐRSÉGI NEMZETI PARK

erdők, rétek, lápok és hagyományos kultúrtáj

1. Elhelyezkedés

Vas megye délnyugati sarkában fekszik. Az Őrségi Nemzeti Parkot 2002. március 1-jén hozták létre. Területe közel 44 000 hektár, és 44 település határát érinti. Az Őrségen túl a Vendvidék, a Rába völgye, a Belső-Őrség és Szentgyörgyvölgy környéke is ide tartozik.



Átlagmagasság: 250–300 m

2. Táj és élőhelyek

Erdős, patakokkal szabdalts dombvidék, ahol fenyvesek, gyertyános-tölgyesek, bükkösök, száraz és nedves rétek, láprétek, lápok és égerligetek váltják egymást. A táj mozaikos, kiscapcellás szerkezetűt az ember és a természet együtt alakította.



erdők



rétek



lápok



patakvölgyek



3. Természeti értékek



Lápok +
tőzgmohák



40 feletti láp található a térségben



A 20 hazai tőzgmohafajból 16 itt is előfordul



A tiszta patakok fontos menedékei sok vízi fajnak



Európai jelentőségű lepkeállományok élnek itt



A rétek és erdők nagy biodiverzitást tartanak fenn

3. Jellegzetes növényfajok

A nemzeti park növényvilága kiemelkedően gazdag; több élőhely jégkorszaki reliktumokat és ritka védett fajokat őriz.



kakasmandikó
(*Erythronium dens-canis*)



kereklevelű
harmatfű
(*Drosera rotundifolia*)



tavaszi tözike
(*Leucocjum vernum*)



szibériai nőszírom
(*Iris sibirica*)



struccharaszt
(*Matteuccia struthiopteris*)

4. Jellegzetes állatfajok

A tiszta patakok, idős erdők és kaszálórétek sok védett állatnak biztosítanak élőhelyet.



fekete gólya



rétisas



haris



foltos szalamandra



vidra



vérfü-
hangyaboglárka

6. Érdekességek



Nevét az egykori nyugati határ őrállóiról kapta



Hírese a kaszáló gyümölcsösök és az ősi gyümölcsfajták



A gyümölcsösök fontos élőhelyei a madaraknak, denevéreknek és lepkéknek



A nemzeti park egyik látványos különlegessége az európai bölény projekt



A táj néprajzi és kultúrtörténeti értékekben is gazdag



7. Miért különleges?



erdő



régi élőhely



patak



láp



gyümölcsös

Az Őrség Magyarország egyik legsajátosabb kultúrtája, ahol a természetes élőhelyek és a hagyományos gazdálkodás együtt őrzik meg rendkívüli élővilágot. Az erdők, rétek, lápok, kaszáló gyümölcsösök és patakvölgyek mozaikja egyszerre természeti és kulturális kincs.

Küldetés kártya sorszáma: 6

Érték: 5 Tr

CSERES-KOCSÁNYTALAN TÖLGYES

Quercetum petraeae-cerris

1. Elterjedés

Hazánk fényben gazdag domb- és alacsony hegyvidéki erdőtürsulása. Legnagyobb állományai az Északi-középhegységben találhatók, de jelentős területei vannak a Dunántúli-középhegységben, valamint a Dél- és Nyugat-Dunántúl több táján is. Többnyire 200–450 m-en, ritkábban 500–600 m magasságban fordul elő.



Natura 2000 élőhely: 91M0

2. Termőhely és klíma

Meleg, mérsékelt száraz, fényben gazdag erdő. Általában barna erdőtalajokon fejlődik, de löszön, andeziten, tufán, mészkövön, dolomiton és homokkövön is előfordulhat. Lombkoronája lazább, ezért a talajszinten több fény jut, mint az üdebb gyertyános-tölgyesekben.



középf farkas
(Dendroctonus medius)



szarvasbogár
(Lucanus cervus)



szajkó
(Garrulus glandarius)



mókus
(Sciurus vulgaris)



őz
(Capreolus capreolus)

4. Jellemző állatfajok

A makkokban, rovarokban és bűvöhelyekben gazdag tölgyes sok madárnak, emlősnek és rovarnak ad élőhelyet. Az idős fák és az odvak különösen fontosak.

3. Jellemző növényfajok

A lombszintet főként a csertölgy és a kocsánytalan tölgy uralja. Az aljnövényzetben gyakoriak a füvek, sások és a fényigényesebb erdei lágyszárúak.



csertölgy
(Quercus cerris)



kocsánytalan tölgy
(Quercus petraea)



mezei juhar
(Acer campestre)



bakfű
(Stachys officinalis)



gyöngyvirág
(Convallaria majalis)



pázsitos nőszirm
(Iris graminea)



hegyi sás
(Carex montana)

5. A társulás jellegzetességei



csér- és kocsánytalan tölgy elegyes állománya



laza, sok fényt átértesztő lombkorona



változó cserjeszint



gazdag fű- és sákszint



sok makktermő fa



mozaikos, fajgazdag erdei élőhely

6. Szintek és ökológiai szerep

felső lombszint
(20–30 m)

cserjeszint
(1–6 m)

gyepszint
(0–1 m)

talajszint



A felső lombszintben a tölgyek uralkodnak.



A cserjeszint változó fejlettségű, a gyepszintben gyakoriak a füvek, sások és virágos lágyszárúak.



A társulás fontos táplálékforrás, fészkelőhely és bűvöhely számos állat számára, és jelentős szerepe van a talajvédelemben valamint a biodiverzitás fenntartásában.

Kártya sorszáma: T11

Érték: 25 Tr

Tartalom:

Hírek
Barátposzáta
Sárgafejű királyka
Kanári
Erdélyi kopasznyakú tyúk
Fenyőszajkó
Holló
Lumma

Smaragd törpetukán
Fehérfejű rétisas
Tippek & trükkök
Mester: Szarka fészke
Küldetés: Őrségi Nemzeti Park
Társulás:
Cseres-kocsánytalan tölgyes



Fehér Sólyom Kiadó
Honlap: www.fehersolyom.hu
e-mail: info@fehersolyom.hu
Felelős kiadó: Helstáb Ákos
Telefon: +36 30 3622632